

Signatera™ vodič za razgovor

Vodič za razgovor s vašim zdravstvenim timom



Šta je Signatera™ test?

Signatera™ je personalizirani test krvi koji se izrađuje prema vašem tumorskom tkivu. Traži mikroskopske fragmente tumorske DNA koja cirkulira u krvi. Test je prilagođen samo vama, pa nijedna dva testa nisu ista.

Zašto je važan kod ginekoloških karcinoma?

Smjernice preporučuju aktivno praćenje, ali su metode ograničene na fizikalni pregled - mnogi recidivi otkriju se tek nakon pojave simptoma.¹ Signatera™ može otkriti porast količine tumorske DNA u krvi mjesecima prije nego što bi se recidiv uočio snimanjem, dajući vama i ljekaru više vremena da razmotrite mogućnosti.

Šta može pokazati mom ljekaru?

Procjena dugoročnog rizika od recidiva

Podrška odlukama o liječenju

Pomno praćenje odgovora na liječenje

Kako se test izvodi?

- 1 Vaše tumorsko tkivo i uzorak krvi analiziraju se da bi se utvrdile jedinstvene DNA mutacije vašeg raka. Vaš personalizirani test izrađuje se za oko 3-4 sedmice.
- 2 Naredna vađenja krvi obavljaju se u ordinaciji ljekara ili kod kuće putem Naterine besplatne mobilne službe za vađenje krvi (u SAD-u).
- 3 Približno sedmicu nakon svakog vađenja krvi, ljekar prima vaš Signatera™ nalaz i s vama razmatra rezultate.

Kako izgledaju nalazi?

Svaki nalaz pokazuje da li je u krvi pronađena tumorska DNA. Nalazi se prate kroz vrijeme na grafikonu. Ljekar koristi trendove, umjesto jedne vrijednosti, pri donošenju odluka o liječenju.

Negativan - nije otkriveno

U ovom trenutku nije pronađena tumorska DNA, što može ukazivati da terapija djeluje. Preporučuje se nastavak praćenja.



Pozitivan - otkriveno

Pronađena je tumorska DNA. To ne znači automatski da se rak vratio. Ljekar će s vama razmotriti dodatna snimanja ili sljedeće korake.



Koliko često ću se testirati?

Učestalost testiranja zavisi od tipa raka i faze liječenja. Vaš zdravstveni tim odredit će odgovarajući raspored za vašu situaciju.



Da li ga pokriva moje osiguranje? (SAD)

Medicare pokriva Signatera™ kod ginekoloških karcinoma: **rak jajnika stadija II-IV tokom adjuvantnog liječenja i praćenja te praćenje odgovora na imuno-onkološko liječenje ginekoloških karcinoma.**

Mnogi pacijenti u SAD-u nemaju vlastite troškove. Prihvataju se svi privatni planovi. Informacije o plaćanju: www.genolab.ba/konsultacije

Priprema za pregled

Označite pitanja koja su vam najvažnija, zapišite šta saznate i ponesite ovaj vodič na pregled.

Kada se Signatera™ može koristiti tokom liječenja ginekoloških karcinoma



Ovaj vodič pruža samo opće informacije i ne predstavlja medicinski savjet. Vaš lekar će protumačiti značenje Signatera™ nalaza za vašu pojedinačnu situaciju.

Pitanja za onkologa - označite relevantna

- ☐ Imam _____ rak. Je li Signatera™ primjerena mom podtipu i stadiju?
- ☐ Mogu li rezultati ovog testa promijeniti izbor dodatnog liječenja koje razmatramo nakon operacije?
- ☐ Šta bi značio pozitivan nalaz? Da li bi se liječenje odmah promijenilo?
- ☐ Kako Natera dolazi do mog tumorskog tkiva? Treba li uzeti novi uzorak?
- ☐ Kako će se Signatera™ koristiti uz snimanja i druge analize krvi?
- ☐ Koliko često i koliko dugo ću trebati vaditi krv?
- ☐ Mogu li vaditi krv kod kuće putem Naterine mobilne službe za vađenje krvi (u SAD-u)?
- ☐ Da li moje osiguranje pokriva Signatera™ test u mojoj situaciji?

Bilješke s pregleda

Šta pokazuju istraživanja?

Rak maternice:

Ovaj test daje vrlo preciznu procjenu šta očekivati nakon operacije. U studijama, pacijentice s negativnim testom imale su znatno manju vjerovatnoću povrata bolesti.^{2,3}

Rezultati istraživanja možda ne odražavaju vašu situaciju. Pitajte onkologa šta dokazi znače za vaš slučaj.

Rak jajnika:

Ovaj test preciznije prepoznaje rane znakove bolesti od standardnog CA-125 testa. U prosjeku može otkriti znakove povrata bolesti oko 9 mjeseci ranije.⁴

Rak grlića maternice:

Ovaj test otkriva znakove povrata bolesti oko 3 mjeseca ranije od standardnih slikovnih pretraga.⁵



Literatura: 1. Salani, R. et al. *Gynecologic Oncology*. Jan; 204:109-117 2. Recio et al. *Gynecologic Oncology* 2024. 182 (2024) 63-69. 3. Ketch PW et al. *JCO Precis Oncol*. 2025 Sep;9:e2500286. 4. Hou JY, et al. *Gynecologic Oncology*. 2022;167: 334-341. doi: 10.1200/PO-25-00286 5. Kuhn et al. SGO Winter, January 30, 2025

Kontakt GenoLab: +387 67 1300 035 | office@genolab.ba | www.genolab.ba/konsultacije



GenoLab d.o.o. | Mis Irbina 24 | 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina | www.genolab.ba

Ograničenja testa: Signatera™ može naručiti samo lekar ili drugi ovlašteni zdravstveni radnik. Informacije iz testa koriste se uz ostale kliničke nalaze; test ne potvrđuje definitivno prisustvo ili odsustvo raka i nije namijenjen dijagnosticiranju raka. Ne zamjenjuje stručni medicinski savjet. Individualni nalazi i kliničko postupanje mogu se razlikovati. Za dodatne informacije o primjeni i ograničenjima testa posjetite www.genolab.ba ili razgovarajte s lekarom. Test nije osmišljen za otkrivanje ili prijavljivanje germinalnih varijanti niti za procjenu nasljednog rizika od raka.

Test razvijen u laboratoriji (LDT), koji se izvodi u CLIA-certificiranoj laboratoriji visokog stepena složenosti. Test nema odobrenje američke Uprave za hranu i lijekove (FDA).
SGN_OS_GYN_PT_DiscussionGuide_20260811_NAT-8024452

